

◎第 4 8 6 回例会 (平成 3 0 年 3 月 1 8 日 午後 1 時～)

場 所 : 岡山県医師会館 4 0 1 会議室

講 演

演 題 「周産期と脳

－胎児・母体の中枢神経障害について考える－

講 師 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

生殖機能協関学教授 宮坂 尚幸 先生

症例報告「妊娠 11 週で感染性流産に至った 1 例」

岡山市立市民病院産婦人科 根津 優子 先生

◎第 4 8 7 例会予告

日 時 : 平成 3 0 年 5 月 2 0 日 午後 1 時～

場 所 : 岡山県医師会館 3 階 三木記念ホール

岡山県産婦人科医会・岡山産科婦人科学会・岡山県医師会 総会

1. 岡山県産婦人科医会総会
2. 岡山産科婦人科学会会計報告
3. 岡山県医師会産婦人科部会報告

岡山県医師会主催 母体保護法指定医師研修会

演題・講師

「未 定」

公益社団法人日本産婦人科医会 副会長 白須 和裕 先生

「出生前検査の経験 －女性の立場から－」(仮題)

立教大学社会福祉研究所 特任研究員 菅野 摂子 先生

「医療安全について」(仮題)

NPO 法人「架け橋」 理事長 豊田 郁子 先生

◎保険だより

1. 「通常」規定のある薬剤については 「通常」規定で使用願います。
  - 1) HCG (注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン) : 無排卵症には通常 1 日 3, 0 0 0 ~ 5, 0 0 0 単位
  - 2) プロゲデポー筋注 1 2 5 mg : 通常成人週 1 回 6 5 ~ 1 2 5 mg
  - 3) メルスモン注 2 mg : 通常 1 日 1 回 2 ml を毎日または隔日
  - 4) クロミッド錠 5 0 mg : 通常第 1 クール 1 日 5 0 mg、無効の場合は 1 日 1 0 0 mg 5 日間なお、「通常」規定外での使用の場合 妥当理由が判る注記が必要です。

2. 抗真菌剤膈錠の使用は用量・用法に従ってください。  
真菌学的効果判定もせず 同一膈錠の漫然とした使用は 査定の対象です。  
(例えば オキナゾール膈錠 6 0 0 m の用量・用法は「1 週 1 回 1 錠を膈深部に挿入する。なお、真菌学的効果 (一次効果) が得られない場合はさらに 1 回 1 錠使用する」)

◎妊産婦死亡例調査について

「妊産婦死亡例登録、調査」(妊産婦死亡は妊娠の期間及び部位に関係なく、妊娠またはその管理に関連した、あるいはそれらによって悪化したすべての原因による妊娠中または分娩後 4 2 日以内における女性の死亡をいいます。)

死亡例発生の都度、速やかに山崎会長までご連絡下さいようお願い申し上げます。

◎おぎゃー献金について

プラスチック製の暖かみのある素敵な献金箱が出来ました。ご希望の方は当支部へお申し込み下さい。

かねてよりご協力願っております「おぎゃー献金」の入金には直接持参して下さるか、便利な中国銀行の振込用紙をご利用下さい。

(振込用紙、献金袋、受領証並びに感謝シールは当支部にあります)